

スカビオサ
Scabiosa
 (マツムシソウ科)

1年草の西洋マツムシソウ (*S.atropurpurea*), ステラータ (*S.stellata*) のガクを觀賞するステルンクーゲル, 宿根草のコーカシカ (*S.caucasica*) や, それらの交雑種などさまざまな種類が流通している. キクと同じで, 花弁は雌しべ, 雄しべをもつ舌状花である. ほぼ満開で出荷される. 水あげはよい. 茎は細く, 葉は貧弱である.

日持ち終了の主な症状は花弁の萎凋である.



1) 品質評価基準

項 目	判 定 基 準	備 考
花弁の萎凋	A: 花弁に張りがある B: 花弁(舌状花)先端がわずかに褐変 C: 花弁(舌状花)先端ががやや褐変し, わずかに萎凋する D: 花弁(舌状花)が変色し, 萎凋する	蕾が開花することはない.
葉の黄変・褐変	A: 黄変, 褐変の発生がない(緑色) B: 葉の先端がわずかに黄変・褐変する C: 葉の1/3程度が黄変・褐変する D: 葉の大部分が黄変・褐変する	出荷時にすでに葉の先端が褐変していることがある(B).
その他		

2) 留意点




3) 開花

コーカシカ (*S. caucasica*)



4) チェック事項

小花の褐変・萎凋



葉の黄変・褐変

